

别名：吹粉, 查理, 可乐, 鼻啤
酒, 鼻糖, 白粉, Rack, 雪, Toot,
Yay-yo

Hi-Ground



免责声明

本教育资源由医护人员和药物使用者共同开发, 面向他们的同龄人和更广泛的社区。Hi-Ground的作用是提供实用, 循证且公正的信息, 帮助你做出明智的选择, 减少伤害, 促进社区关怀和健康。在未受监管的市场中, 我们无法得知任何药物的纯度或剂量。选择使用来自未受监管市场的药物本身就有风险, 你可以通过自我教育并采取减少伤害的措施来降低这种风险。

知识就是力量。

本资源由 QuIVAA的Hi-Ground项目开发。如需了解更多信息, 请访问www.hi-ground.org

盐酸可卡因是一种通过在古柯叶膏中加入盐酸制成的白色结晶性粉末。可卡因是一种作用于中枢神经系统(CNS)的短效兴奋剂,可加快心率和呼吸。

化合物: 苯甲酰甲基可待因盐酸盐

使用方法

最常见的使用方式是鼻吸(嗅吸),但也可以直肠给药,静脉注射或吞服。

药效持续时间(鼻吸)

总持续时间:45分钟-1.5小时

起效时间:5-10分钟

峰值时间:20-40分钟

药效减退:10-30分钟

后续效应:1-4小时

半衰期:尽管药物的明显效果会在1小时后消退,但在服药后的2小时内,药物仍在体内活跃。如果计划使用他药物或再次用药,请牢记这一点。



药物测试

路边警察检测:在澳大利亚多个州,路边药物检测中都会检测可卡因。唾液检测可在使用后24至72小时内检测到可卡因。

药物检测

建议进行实验室级别的检测以获得最佳检测结果,目前堪培拉(澳大利亚首都地区),布里斯班和黄金海岸(昆士兰州)提供免费且匿名的药物检测服务。药物检测有助于排除不易预测或不良的高毒性危险药物。

最常见的影响:

精力增强,失眠,心率/血压升高,瞳孔放大,体温升高,出汗,食欲下降,极度兴奋,自信心和/或自尊感增强,性欲增强或减弱,混乱

不太常见的影响:

鼻腔组织损伤,易怒/好斗,专注力提高,恐惧,焦虑

罕见影响:

癫痫,中风或心脏病发作的风险,精神病,兴奋性谵妄综合征,妄想症幻觉(由睡眠不足引起)

如需紧急帮助

如果出现不良反应,感到不适或有任何担忧,请拨打000获取紧急帮助。



更安全的使用建议

- 从极少剂量开始以检测药物强度并评估自己的敏感性。
- 给药物足够的时间生效-药效可能比预期来得更慢
- 由于可卡因的强效性,通常以小剂量“点吸”的方式使用,而不是一次性大剂量使用(例如划线)。药物通过鼻腔内膜进入血液循环。
- 注意过热或心率升高,定期降温放松
- 尝试设置使用上限以及结束使用的时间,以免过量使用。
- 将粉末压碎以免结晶颗粒划伤鼻腔
- 在使用前后少量吸入水分以保护鼻腔内膜
- 使用自己干净的吸管或勺子吸入,避免感染风险,如疣(HPV)或通过微量血液传播的病毒(如丙型肝炎)
- 不要用钱吸入-纸币上面布满了细菌。
- 反复鼻吸会损伤鼻腔膜,可能导致鼻中隔(鼻腔中间部分)永久性受损。频繁流鼻血,流鼻涕,以及丧失嗅觉和吞咽困难
- 经常换鼻孔吸入并让鼻腔适当休息
- 睡觉!或者至少在24小时内躺下并遮住眼睛休息。可卡因的许多负面影响都是由睡眠不足引起