

别名:黑焦油, 中国白粉, GEAR, 海洛因, H, 锤子, 哈里, HOMEBAKE, HORSE, JUNK, SKAG, SMACK, THE DRAGON, BUPE, 葡萄, GREY NURSES, GREYS, 土海洛因, 嗨嗨水, 吗啡, 异硝氮烯(科学怪人), OC, ORANGES, OX, OXY, 紫色饮料, SUBBIES

阿片类药物



免责声明

本教育资源由医护人员和药物使用者共同开发, 面向他们的同龄人和更广泛的社区。Hi-Ground的作用是提供实用, 循证且公正的信息, 帮助你做出明智的选择, 减少伤害, 促进社区关怀和健康。在未受监管的市场中, 我们无法得知任何药物的纯度或剂量。选择使用来自未受监管市场的药物本身就有风险, 你可以通过自我教育并采取减少伤害的措施来降低这种风险。

知识就是力量。

本资源由 QuIVAA的Hi-Ground项目开发。如需了解更多信息, 请访问www.hi-ground.org

阿片类药物是一类作用于中枢神经系统的抑制药物,包括可待因,吗啡,海洛因,芬太尼及其他多种药物。这些药物来源于罂粟或与罂粟中的物质相似,包括天然产生的(即鸦片类)和合成的物质。阿片类药物是用于止痛的药物,其药效差异很大,通常用于治疗慢性疼痛或术后疼痛,或用于治疗如骨折等导致的严重短期疼痛。阿片类药物也常被用于娱乐,包括通过非法使用处方阿片类药物或通过使用非法物质(尤其是海洛因)。异硝氮烯又称苯并咪唑类阿片,是一类药效很强的合成阿片类药物,其药效差异很大。某些异硝氮类药物,包括质子硝氮和依托硝氮,比芬太尼的药效更强,因此用药过量的风险非常高。

化合物:羟考酮(奥施康定)、氢可酮(维柯丁)、可待因、二乙酰吗啡、吗啡、曲马多、美沙酮、布洛芬诺菲及其他

使用方式

最常见的方式是吞服,也可通过直肠给药,鼻吸或静脉/肌肉注射。

药效持续时间

持续时间和半衰期取决于阿片类药物的类型,并且其起效时间,峰值时间和总持续时间各有不同。请研究了解您正在使用的特定药物。

*阿片类药物作用时间长短不一。从15分钟到36小时不等。例如哌替啶的作用时间远短于羟考酮,而芬太尼的作用可持续至72小时。

即使药物的明显效果看似已经消失,但阿片类药物可能仍然在体内活跃很长一段时间(长达几天),这取决于药物的类型。请自行研究了解。

药物测试

路边警察检测:路边唾液测试不会专门检测阿片类药物,但可能检测到掺入非法阿片中的其他物质。驾驶时服用任何非法药物(包括阿片类药物)均属违法,驾驶员可能需要接受路边行为能力受损测试。建议至少在服药24小时后再驾驶。

药物检测:建议进行实验室级别的检测以获得最佳检测结果。目前堪培拉(澳大利亚首都地区),布里斯班和黄金海岸(昆士兰州)提供免费且匿名的药物检测。在澳大利亚的海洛因和可卡因样本中已发现芬太尼和合成阿片类药物(如异硝氮类),这些物质曾导致致命的过量案例。

影响

效果因人而异。

最常见的影响:

缓解疼痛,极度兴奋,幸福感,满足感,心率下降,血压下降,四肢发热,倦怠感,嗜睡,便秘,瘙痒,缓解焦虑,一股‘奔涌’的暖流,混乱感,瞳孔收缩(“针尖状”),呼吸减慢

不太常见的影响:

失去意识,呕吐,恶心,呼吸抑制/衰竭,偏执,肌肉痉挛,死亡

罕见影响:

昏迷风险,手指,脚趾,嘴唇发蓝,呼吸抑制导致脑损伤

潜在的长期影响:

长期使用可能会导致 牙齿健康状况不佳(牙龈肿胀,牙齿受损),严重便秘,营养不良,依赖性和急性戒断症状风险,免疫系统减弱,失眠

如需紧急帮助

如果出现不良反应、感到不适或有任何担忧,请拨打000获取紧急帮助。

更安全的使用与用药建议

- 在朋友或信任的人身边和你感到安全舒适的环境中服用
- 注意药物强度,尤其是海洛因,其强度因交易和批次而异。如果不确定,建议先服用“正常”剂量的一半以避免过量。如果您没有依赖性或已经很长时间未使用,即使是很少量也可能致命,建议先尝试极少的测试剂量。
- 进食后至少等待30分钟再服用。
- 每种阿片类药物都不尽相同且强度差异很大,因此应从小剂量开始。
- 若由医生开具处方,阿片类药物都附有剂量指示说明。
- 随身携带纳洛酮。根据所在州的规定,你可以在药房购买(是否需要处方视情况而定)。昆士兰州QuIHN’s针头与注射器服务中心也提供免费的纳洛酮培训,并可免费领取一个纳洛酮回家。
- 与其他药物的危险组合包括酒精,苯二氮卓类药物、氯胺酮、GHB、MXE、曲马多、Lyrica 及某些抗组胺药。

吞服

如有包装,请按照包装建议使用。



注射

- 现在,许多阿片类药物都有防伪功能,可能无法很好地溶解。如果注射,可能会导致危险后果。现在许多药物还含有纳洛酮,使用者需注意以避免出现戒断反应。
- 使用新的无菌注射器和设备以避免感染血源性病毒(BBV)。
- 使用无菌水进行混合。
- 使用前后要彻底清洗双手,也可以用酒精棉签清洁指尖。
- 如果使用得当,酒精擦拭布可以降低皮肤感染的风险。为达到最佳效果,请在注射部位单向擦拭一次,然后自然晾干。
- 注射器和设备请妥善置于黄色垃圾箱,所有针具与注射服务中心均提供垃圾箱。